

INFORMATION OM OPERATION PÅ HEST

Dyrlægerne Nørhald

Østermarksvej 24B, 8983 Gjerlev

Tlf. 20 70 40 44 • www.hestedoktor.dk



Formål

Denne folder giver generel information om, hvordan du forbereder din hest til operation, og hvilke almindelige og sjældne komplikationer der kan forekomme i forbindelse med bedøvelse og kirurgi.

Formålet er at sikre, at du som ejer føler dig tryk og er velinformeret, inden du giver samtykke til indgrebet.

Ved enkelte typer operationer (fx kastration, tandkirurgi eller fjernelse af hudtumorer) kan der forekomme **særlige risici**, som du informeres om direkte af dyrlægen.

Før operationen

- ✓ Hesten skal være **rask og ren** på operationsdagen. Kontakt os, hvis hesten har feber, nedsat appetit, næseflåd eller virker sløj.
- ✓ **Hestepas skal medbringes** og afleveres sammen med hesten.
- ✓ Dyrlægen vil foretage en sundhedsundersøgelse før operationen for at vurdere hestens tilstand og bedøvelsesrisiko.

Generelle risici ved operation og bedøvelse

Selv ved korrekt udført operation kan der opstå komplikationer. De er sjældne, men du bør kende til dem:

- **Bedøvelse:** I sjældne tilfælde kan hesten reagere med blodtryksfald eller have svært ved at rejse sig. Dødsfald under narkose er meget sjældent, men muligt.
- **Opvågning:** Nogle heste kan blive urolige og komme til skade, mens de rejser sig. Vores opvågningsbokse er polstrede for at mindske risikoen.
- **Blødning:** Der kan opstå blødning under eller efter operation. I sjældne tilfælde kan blødningen være alvorlig.



- **Infektion:** Bakterier kan forårsage infektion i operationssåret eller luftvejene. Det behandles som regel uden problemer.
 - **Kolik eller mave-tarm-forstyrrelser:** Stress efter operation kan i sjældne tilfælde give forstoppelse eller fejlgæring. Vi overvåger hesten nøje efter indgrebet.
-

Særlige komplikationer ved visse indgreb

Ved nogle operationer, fx **kastration af hingst**, kan der desuden forekomme:

- Indre eller ydre **blødning** (sjældent, men alvorlig)
 - **Infektion eller sædstrengsfistel**
 - **Tarmfremfald (herniering)** – en sjældent, men alvorlig komplikation, som kræver akut behandling
-

Efter operationen

Hesten skal observeres dagligt i de første 10 dage. Kontakt os straks, hvis du bemærker:

- Kraftig hævelse eller blødning
- Feber, nedsat appetit eller smertereaktion
- Vævsfremspring fra såret eller tegn på kolik

Vi vurderer altid situationen og kan give råd om videre behandling.

Kontakt os ved tvivl

Er du i tvivl om noget som helst – selv den mindste usikkerhed om risici, forløb eller efterpleje – så kontakt os straks.

Vi tager hellere en samtale for meget end en for lidt. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryk og forstår al information, før din hest opereres.

Version & kontakt

Dyrlægerne Nørhald

Østermarksvej 24B, 8983 Gjerlev

 20 70 40 44 •  www.hestedoktor.dk

Denne folder er senest opdateret oktober 2025 og indeholder generel information. Den erstatter ikke individuel faglig rådgivning, så kontakt os, hvis du har spørgsmål om netop din hest.